4. L'APPROCHE DE LA FIN DE VIE

La prise de la médication PO difficile

- Encore plus de ménage!
- Écraser ce qui peut l'être (pharmacien)
- Médicaments en sirop
- Ouvrir les capsules (ne pas croquer les granules)
  - M-eslon, Kadian, Hydromorph contin, prégabaline, gabapentin
- Prise avec texture molle (purée, pouding, yogourt)
- La prise bucco-gingivale (ou transmuqueuse buccale)
- La voie s/c

L'administration du bucco-gingival

- Quand l'utiliser:
  - Prise PO plus difficile
  - Malabsorption digestive
  - Transit ralenti ou risque de subocclusion
- Dose=comme s/c (donc opioïdes = ½ dose)
- Médicaments possibles: opioïdes (méthadone=sirop), méthotriméprazine, halopéridol, benzodiazépines
- Produit utilisé:
  - Liquide (solution injectable) ou comprimé écrasé
- Référence utile: conférence de Dre Anne Paquette





La voie sous-cutanée

- Mise en seringues par:
  - Infirmière au chevet
  - Pharmacie sous hotte
- Feuilles de prescriptions de la médication sous-cutanée
- Prescription du protocole de détresse
- Feuilles de suivi de la médication au chevet

Article de référence…

- *Durée de stabilité de médicaments en seringue pour administration sous-cutanée à des patients en fin de vie à domicile.*
- Auteurs: Annie Roberge et autres pharmaciens
- Pharmactuel, Vol. 41, N°4 (août-septembre 2008)