

Q1- Quelle est l'urgence la plus fréquente à \_\_\_\_\_  
domicile pour les cas de soins palliatifs ?



- 1- Les douleurs sévères ou atroces
- 2- Les hémorragies
- 3- Le surdosage aux opiacés
- 4- L'agonie rapide
- 5- L'abus d'opiacés

# Q-1 Réponse: 4- L'agonie

Médecin à domicile: question à se poser à chaque visite:

**Cette malade est-elle en pré agonie ?**

- Une agonie à domicile est une urgence  
(+++ préparation nécessaire ).
- Valeur de notre pronostic: mauvaise sauf tout proche de l'agonie....effet « météo ».



Q-2 La prescription de fin de vie à  
ne pas faire d'avance pour Janine ?

- 1- Opiacé injectable en IV
- 2- Opiacé injectable en SC
- 3- Tranquillisant mineur SL
- 4- Anticholinergique SC
- 5- Sonde urinaire

Q-2 La prescription de fin de vie à ne pas  
faire d'avance pour Janine ?

**Réponse: 1- Opiacé IV**

- Il est très rare que l'on utilise la voie IV à domicile pour les opiacés re
- plus de risque de dépression respiratoire
- supervision médicale nécessaire
- rarement nécessaire (délai de la SC 20 minutes)

Q-3 Janine-votre trousse d'urgence est prescrite:  
autre situation **urgente** à traiter en priorité  
chez elle?

- 1- Insuffisance hépatique sévère
- 2- Douleurs hépatiques et osseuses
- 3- Anémie symptomatique ( aregénérative très probable par envahissement médullaire )
- 4- Constipation sous codéine...à risque de fécalome, ou d'occlusion...
- 5- La signature du document de non réanimation

Q-3 Janine- Votre trousse d'urgence est prescrite: autre situation **urgente** à traiter en priorité chez elle ?

- Les douleurs sévères doivent être considérées comme une urgence en soins palliatifs.

Q-4 Janine: Quel type d'analgésique serait le plus approprié **à ce stade** pour soulager ses douleurs sévères ?

- 1) AINS
- 2) Dexaméthasone
- 3) Codéine à plus haute dose
- 4) Un opiacé plus « puissant »
- 5) Acétaminophène en association avec la codéine

Q-4 Janine: Quel type d'analgésique serait le plus approprié **à ce stade** pour soulager ses douleurs sévères ?

- 1) AINS
- 2) Dexaméthasone
- 3) Codéine à plus haute dose
- 4) Un opiacé plus « puissant »
- 5) Acétaminophène en association avec la codéine

## **Q-5 Opiacés plus puissant: quelle prescription faites-vous à Janine ?**

- 1-** Morphine PO - CA 5 mg aux 4 h , avec ED de 2,5 mg aux 1-4 h PRN ( max 10/ 24 h ), à augmenter selon réponse après 3-7 jours
- 2-** Morphine PO -CA 5 mg aux 4 h , avec ED de 2,5 mg aux 1-4 h PRN ( max 10/ 24h ), à augmenter selon réponse après 24 h
- 3-** Morphine LA 15 mg aux 12 h
- 4-** Morphine LA 30 mg aux 12 h
- 5-** Fentanyl 25 µg / h
- 6-** Fentanyl-timbre de 25 µg / h

**CA= courte action**

**LA= longue action**

**ED= entre dose**

## Q 5-Réponse : **2** (morphine CA à réévaluer après 12-24 h)

2) Morphine PO -CA 5 mg aux 4 h, avec ED de 2,5 mg aux 1-4 h PRN, à augmenter selon réponse **au cours des prochaines 12- 24 h...par téléphone**

**Q-6**      **Quelle sera votre prescription à ces stades pour Janine ?**

- 1- 10 mg aux 4 h avec ED de 5 mg aux 1-4 h
- 2- 15 mg aux 4 h avec ED de 7,5 mg aux 1-4h
- 3- 20 mg aux 4 h avec ED de 10 mg aux 1-4 h
- 4- Morphine LA 30 mg aux 12 h
- 5- Morphine LA 60 mg aux 12 h
- 6- Fentanyl TD 50 µg/h

## Q-6 Réponse : 2

- 2- Morphine 15 mg aux 4 h avec ED de 7,5 mg aux 1-4h, (max 10 par jour).

**Q-7 Jour 2: Janine est soulagée ( 0-1/10)avec 100 mg de morphine CA totale par jour; quelle force de timbre de Fentanyl lui sera prescrit ?**

- 1- Fentanyl TD de 25 µg/h
- 2- Fentanyl TD 25 µg /h
- 3- Fentanyl TD 50 µg /h
- 4- Fentanyl TD 75 µg /h
- 5- Fentanyl TD 100 µg /h

Q-7 Réponse: 3

3- Fentanyl TD 50  $\mu\text{g}$  /h

**Q-8 3 semaines plus tard: si Janine était sous Fentanyl 50 µg/h au début d'une agonie paisible, quelle prescription n'est pas appropriée ?**

- 1) Scopolamine 0,4 mg SC PRN aux 4-8h
- 2) Scopolamine 0,6 mg SC PRN aux 4-8 h
- 3) Morphine 10 mg/ml, 1 ml SC PRN/1- 4 h
- 4) Morphine 10 mg/ml, 0,5 ml SC PRN/1- 4 h
- 5) Ativan SL 1 mg PRN aux 1-6 h

## Q8- Réponse: 3

- Morphine 10 mg/ml, 10 mg SC PRN/ 1- 4 h...n'est **pas un bon choix** car:
  - ✓ la dose est trop forte puisque l'on garde le Fentanyl à l'agonie (domicile),
  - ✓ donc la morphine sert pour les ED seulement:  
10 % de 50 mg équivalent morphine Die = 5 mg SC de morphine pour les ED sous Fentanyl 50 µg.